

# IMPLANTOLOGIE ORALE

PROFESSEUR AGRÉGÉ DU VAL DE GRACE

31 AV VICTOR HUGO PARIS 16  
TEL : 01 45 02 18 92 FAX : 01 45 02 18 97  
M@IL : PRPARANQUE@MAC.COM  
SITE : WWW.ARMAND-PARANQUE.FR

Les implants dentaires sont des vis en titane qui remplacent vos racines dentaires absentes. Ce sont donc des racines artificielles sur lesquelles sera connectée la prothèse provisoire, puis définitive. Classiquement, le traitement se déroule en quatre temps.


- 1- L'implant est posé au sein d'une structure offrant des conditions d'asepsie rigoureuses (bloc opératoire du cabinet ou clinique chirurgicale). L'intervention est le plus souvent réalisée sous anesthésie locale, parfois sous neuroleptanalgésie (uniquement en clinique).

Il est important d'avoir mangé normalement avant l'anesthésie locale.


Les suites opératoires sont peu douloureuses. En cas de douleurs, celles-ci sont aisément calmées par la prescription d'antalgiques simples (paracétamol).

L'œdème est maximum le surlendemain de l'intervention. Il peut justifier l'application de compresses imbibées de sérum physiologique glacé sur la région opérée plusieurs fois par jour.


Parfois votre prothèse ne pourra être remplacée dans les suites immédiates de l'intervention.



- 2- 2 à 4 mois plus tard, sous anesthésie locale, l'implant est mis en fonction : un pilier provisoire (pilier de cicatrisation) est vissé sur l'implant, dépassant de la gencive et lui permettant de cicatriser en se moulant autour de lui. Parfois, ce geste est réalisé lors de la première étape, c'est la technique en un temps (ou technique suisse)



- 3- Deux à trois semaines plus tard, ce pilier provisoire est remplacé par un pilier définitif, sur lequel viendra se connecter la prothèse. Les étapes prothétiques peuvent éventuellement débiter le jour même.



#### Remarques :

- Dans certaines conditions très particulières, la prothèse provisoire peut être posée dans les quarante huit heures suivant la pose des implants, c'est la mise en charge immédiate.
- Une visite de contrôle est souhaitable une fois par an, le plus souvent réalisée chez votre Chirurgien-Dentiste qui a réalisé la prothèse.
- L'implant est une solution prothétique extrêmement fiable utilisée depuis 1965 et offrant des taux de succès de 96 % environ. En cas d'échec, l'implant sera déposé sous anesthésie locale. Un nouvel implant pourra presque toujours être posé quelques semaines plus tard.
- Le tabac augmente les risques d'échec. Il est conseillé d'arrêter de fumer au moins trois semaines avant la pose des implants.

Au total, il ne faut pas surévaluer les risques, mais simplement prendre conscience qu'une intervention chirurgicale, même apparemment simple, comporte toujours une petite part d'aléas.

**Le recours à un Chirurgien qualifié et expérimenté, opérant au sein d'une structure de soins sérieuse aux conditions d'asepsie irréprochables, vous assure des meilleures garanties d'éviter ces complications, où de les traiter efficacement le cas échéant.**